

L'impétigo

Qu'est-ce que c'est?

- C'est une infection bactérienne courante de la peau qui est causée par le *Staphylococcus aureus* ou le streptocoque du groupe A.
- Les bactéries s'infiltrant par une ouverture de la peau, comme une coupure, une morsure ou une brûlure, puis se multiplient, ce qui entraîne la formation d'une plaie d'où s'écoule un liquide jaunâtre.

Comment se propage-t-il?

- Par le contact direct avec le liquide qui s'écoule d'une plaie.
- Par le contact direct avec des objets contaminés après qu'une personne infectée les a touchés.
- L'infection peut se transmettre d'une plaie à une autre partie ouverte du corps si on gratte la plaie, puis qu'on touche à d'autres parties ouvertes de la peau.

Quels sont les symptômes?

- Apparition de petits boutons rouges ou d'ampoules remplies de liquide ainsi que d'une croûte jaunâtre n'importe où sur le corps, mais habituellement sur le visage.
- Les plaies ne causent habituellement pas de douleur, bien que certaines personnes signalent une sensation de brûlure ou des démangeaisons.
- Dans les cas plus graves, on peut avoir de la fièvre, ressentir de la douleur, avoir une enflure ou se sentir faible.

Quand les symptômes apparaissent-ils?

- Après l'exposition à une personne infectée, le temps qui s'écoule avant l'apparition des symptômes varie selon la bactérie qui est à l'origine de l'infection.

- Pendant combien de temps est-il transmissible? La maladie est transmissible jusqu'à au moins 24 heures après le début du traitement aux antibiotiques.
- La maladie est transmissible jusqu'à au moins 24 heures après le début du traitement aux antibiotiques.
- Si l'impétigo n'est pas traité, il est transmissible tant qu'il y a un écoulement des lésions.

Comment le traite-t-on?

On traite l'impétigo au moyen d'antibiotiques administrés par voie orale ou sous forme d'onguent.

Comment peut-on le prévenir?

Bien se laver les mains souvent :

- surtout après avoir touché les plaies;
- après avoir toussé ou éternué.
- Ne pas partager d'articles personnels comme les serviettes.
- Tâcher de garder les lésions bien couvertes à l'aide d'un pansement lâche qui permet le passage de l'air.
- Laver les vêtements contaminés tous les jours.
- Nettoyer et désinfecter, tous les jours, tous les jouets, les accessoires et les surfaces touchées fréquemment.
- Garder les ongles courts afin d'éviter les égratignures et de réduire la propagation des infections par les ongles contaminés.

Devrais-je aller à la garderie, à l'école ou au travail?

Les personnes infectées devraient être exclues de la garderie, de l'école ou du travail jusqu'à 24 heures après le début du traitement aux antibiotiques.

Pour en savoir plus long, appelez le personnel du Programme de contrôle des maladies transmissibles

345, rue Oak Ouest
North Bay, ON P1B 2T2
Tel/Tél: 705-474-1400
Fax/Télé: 705-474-2809

70 Joseph Street, Unit 302
Parry Sound, ON P2A 2G5
Tel/Tél: 705-746-5801
Fax/Télé: 705-746-2711

1-800-563-2808
www.myhealthunit.ca



au 705 474-1400 ou au 1 800 563 2808, poste 5229.

Références

American Academy of Pediatrics. Aronson, S. S. et T. R. Shope (dir.). « Impetigo », dans *Managing infectious diseases in child care and schools: A quick reference guide*, 4th édition. Elk Grove Village, American Academy of Pediatrics, 2017, p. 107-108.

American Academy of Pediatrics. Kimberlin, D. W., M. T. Brady, M. A. Jackson et S. S. Long (dir.). « Children in Out-of-Home Child care », dans *Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases*, 30^e édition. Elk Grove Village, American Academy of Pediatrics, 2015, p. 138.

Société canadienne de pédiatrie, Soins de nos enfants.

L'impétigo, 2013. Récupéré du site Web

<http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/impetigo>.

Annexe au document WI-CDC-011 – 2018-08-10

345, rue Oak Ouest
North Bay, ON P1B 2T2
Tel/Tél: 705-474-1400
Fax/Télé: 705-474-2809

70 Joseph Street, Unit 302
Parry Sound, ON P2A 2G5
Tel/Tél: 705-746-5801
Fax/Télé: 705-746-2711

1-800-563-2808
www.myhealthunit.ca

