

Outil de soutien au dépistage dans les écoles et les services de garde d'enfants

**Cet outil peut être utilisé dans les écoles et les services de garde d'enfants pour aider à déterminer ce que signifie un symptôme indicateur ou une réponse « Oui » dans [l'outil de dépistage du Ministère](#).*

Ce ne sont pas tous les symptômes qui exigent l'usage du protocole contre la COVID-19. Par exemple, le protocole pour une cheville foulée est d'envoyer l'enfant à la maison pour qu'on lui applique de la glace, qu'il se repose et qu'il revienne à l'école le lendemain.

Le tableau ci-dessous présente d'autres facteurs à prendre en considération en ce qui a trait aux symptômes. Cet outil de dépistage **ne peut pas servir à diagnostiquer** la COVID-19; **en cas de doute, renvoyez l'enfant à la maison**. Si les parents ont des questions d'ordre médical, on leur recommande de consulter un fournisseur de soins de santé.

En cas de questions liées aux directives sur les tests de COVID-19 et l'isolement, appelez la **ligne de renseignements provincial** au **1-888-777-0730**.

SYMPTÔME	QUAND RENVOYER UN ÉLÈVE/ENFANT À LA MAISON	AUTRES QUESTIONS OU FACTEURS	SOLUTIONS À ESSAYER EN CAS D'INCERTITUDE
FIÈVRE ET/OU FRISSONS	<p>Température supérieure ou égale à 37,8 °C ou 100 °F : Le fabricant de l'appareil utilisé pour vérifier la température, comme un thermomètre auriculaire ou un thermomètre pour le front, fournit de l'information sur la façon de s'en servir. Assurez-vous de lire et de suivre les instructions pour obtenir la température exacte. Vous pourriez également y trouver de l'information sur la corrélation entre les résultats donnés par l'appareil et ceux obtenus au moyen d'autres méthodes de prise de température.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'enfant porte-t-il des vêtements trop chauds, ou revient-il d'un cours d'éducation physique ou de la récréation? • Fait-il plus chaud qu'en temps normal dans la pièce ou à l'extérieur? 	<ul style="list-style-type: none"> • Avant la prise de la température (environ 20 minutes), l'enfant était-il au repos et à l'aise s'il revenait à l'intérieur ou venait de terminer une activité? • Envisagez de prendre la température à nouveau pour confirmer le résultat.
TOUX OU TOUX ABOYANTE (CROUP)	<p>Continue, inhabituelle ou plus grave qu'en temps normal, ou respiration sifflante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'agit-il d'un problème chronique qui s'aggrave chez l'enfant? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si <u>oui</u>, il devrait être renvoyé à la maison. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cet enfant souffre-t-il d'asthme ou produit-il beaucoup de mucus? 	<ul style="list-style-type: none"> • L'enfant a-t-il un inhalateur?

Your lifetime partner in healthy living.
Votre partenaire à vie pour vivre en santé.
myhealthunit.ca

Call Toll Free: 1-800-563-2808

 345 Oak Street West,
North Bay, ON P1B 2T2
 705-474-1400
 705-474-8252

 70 Joseph Street, Unit 302
Parry Sound, ON P2A 2G5
 705-746-5801
 705-746-2711

ESSOUFFLEMENT	Essoufflement, incapacité de prendre des respirations profondes : <ul style="list-style-type: none"> • L'enfant peut-il soutenir une conversation? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si <u>non</u>, l'enfant devrait être renvoyé à la maison. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cet enfant souffre-t-il d'asthme ou d'autres problèmes respiratoires connus, en particulier après un effort? 	<ul style="list-style-type: none"> • L'enfant était-il au repos et à l'aise s'il revenait à l'intérieur ou venait de terminer une activité? • L'enfant a-t-il un inhalateur?
DIMINUTION OU PERTE DU GOÛT OU DE L'ODORAT	<ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme n'est pas lié à d'autres causes ou problèmes connus dont l'enfant souffre déjà. • S'agit-il d'un problème chronique qui s'aggrave chez l'enfant? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si <u>oui</u>, il devrait être renvoyé à la maison. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cet enfant souffre-t-il d'allergies saisonnières, de troubles neurologiques, de problèmes nasaux connus, etc.? 	
NAUSÉE, VOMISSEMENTS ET/OU DIARRHÉE	<ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme n'est pas lié à d'autres causes ou problèmes connus dont l'enfant souffre déjà. • S'agit-il d'un problème chronique qui s'aggrave chez l'enfant? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Si <u>oui</u>, il devrait être renvoyé à la maison. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'enfant souffre-t-il du syndrome du côlon irritable? • L'enfant souffre-t-il d'anxiété ou a-t-il récemment vécu une interaction stressante avec des camarades, des problèmes à la maison ou d'autres situations stressantes liées à l'école? • Est-ce que l'élève souffre de crampes menstruelles? 	<ul style="list-style-type: none"> • Offrez-lui un verre d'eau. • Offrez-lui une collation. • Permettez à l'enfant d'utiliser les toilettes.

Your lifetime partner in healthy living.
Votre partenaire à vie pour vivre en santé.
myhealthunit.ca

Call Toll Free: 1-800-563-2808

 345 Oak Street West,
North Bay, ON P1B 2T2
 705-474-1400
 705-474-8252

 70 Joseph Street, Unit 302
Parry Sound, ON P2A 2G5
 705-746-5801
 705-746-2711

		<ul style="list-style-type: none">• L'enfant souffre-t-il de gaz ou de constipation?<ul style="list-style-type: none">◦ Quand l'enfant est-il allé à la selle pour la dernière fois?• La douleur pourrait-elle être causée par un aliment qu'il a consommé (sensibilité alimentaire)?• Cet enfant vient-il de descendre de l'autobus (p. ex. mal des transports)?• L'enfant pourrait-il avoir faim?<ul style="list-style-type: none">◦ Quand a-t-il mangé pour la dernière fois et qu'a-t-il mangé?	
--	--	--	--

Your lifetime partner in healthy living.
Votre partenaire à vie pour vivre en santé.
myhealthunit.ca

Call Toll Free: 1-800-563-2808

 345 Oak Street West,
North Bay, ON P1B 2T2
 705-474-1400
 705-474-8252

 70 Joseph Street, Unit 302
Parry Sound, ON P2A 2G5
 705-746-5801
 705-746-2711